


# АНСС

## Первая линия защиты Вашего организма!

АНСС® (Active Hexose Correlated Compound)



MADE IN JAPAN

- ☆ Эффективен при комплексном лечении рака и гепатитов.
- ☆ Снижает побочные эффекты химио- и радиотерапии.
- ☆ Сохраняет функции печени при гепатитах (включая «С»).
- ☆ Профилактика вирусных инфекций при эпидемиях.
- ☆ Смягчает реакцию организма на стрессовые ситуации.
- ☆ Содержит 21600 мг чистого экстракта «АНСС».
- ☆ Поставляется напрямую от японского производителя.
- ☆ Используется во всем мире с 1987 г.



АНСС®

Разработан и изготавливается в Японии.

**Что такое АНСС**  
В качестве сырья для производства «АНСС» используется нитевидный мицелий грибной культуры на основе гриба шиитаке. Лечебные свойства мицелия шиитаке открыты учеными Токийского университета. Только на заводе компании-разработчика «Amino Up Chemical» имеется специальное оборудование и применяются эксклюзивные технологии для производства из культивированного мицелия препарата «АНСС». Препарат содержит 21600 мг чистого «АНСС», единственная форма от разработчика, содержащая максимальное количество активного вещества без изменения формулы. Препарат имеет очень низкую аллергическую активность, побочных эффектов не обнаружено.

### В чем особенность АНСС

Современные противоопухолевые препараты эффективны, но являются токсичными как для раковых, так и для здоровых клеток. Здоровые клетки (включая клетки костного мозга) повреждаются, появляются побочные эффекты от приема лекарств – анемия, иммунодефицит, поражение печени, дерматит, выпадение волос. «АНСС» обладает способностью активизировать иммунные клетки NK («натуральные киллеры») в 3 раза, а благодаря наличию NK организм борется с раковыми клетками собственными силами на уровне клеточного иммунитета. Активность NK наблюдается уже через 4 часа после приема препарата.

Свойство противоопухолевой активности «АНСС» затрагивает регенерацию здоровых клеток в организме, позволяющую выдержать лечение сильнействующими лекарствами.

Применение «АНСС» в комплексном лечении повышает эффективность применяемых лекарств, снижает побочные эффекты.

### Когда применять АНСС

На протяжении проводимых в течении 20 лет наблюдений за динамикой заболеваний в случаях, когда применялся «АНСС», позитивные изменения зарегистрированы в группах больных раком желудка, раком груди, раком шейки матки, раком легких, раком кишечника, гепатитом, сахарным диабетом, гипертонией, подагрой, лейкемией. Препарат применяется в комплексе с лекарствами, назначаемыми врачом с целью усиления эффективности лечения.

### Как применять АНСС

Способ приема: до еды или во время еды, запивать водой, за один прием принимать не более 10 капсул.

Курс приема базовый - 14-21 день рекомендуемой дозировки.

Курс индукции ремиссии - 3 раза в день по 5 капсул применяется для послеоперационного восстановления. Длительность приема – 96 дней.


### Рекомендуемая дозировка

- Профилактика вирусных заболеваний - 3-6 капсул в день.
- Аллергия на пыльцу, простуда - 12 капсул в день.
- Гепатит С, заболевания печени, цирроз - 18 капсул в день.
- Профилактика рецидивов, цирроз - 21 капсула в день.
- Лечение опухолей, химиотерапия - 30 капсул в день.
- Радиационное облучение - 30 капсул в день.

### Повышение эффективности противораковой терапии


Комплексная противораковая терапия «АНСС» + Цисплатин  
После 45-дневного курса терапии были сравнены изменения площади опухоли.  
Группа А – терапия не проводилась – величина опухоли 100%  
Группа В – терапия только «АНСС» – величина опухоли 98% (эффект -2%)  
Группа С – терапия лекарством Цисплатин – величина опухоли 95% (эффект -5%)  
Группа D – комплексная терапия «АНСС» + Цисплатин – величина опухоли 84% (эффект -16%)

Источник - доклад Техасского Университета на Международной Конференции Общества Интегративной Онкологии (9th International Conference of the Society for Integrative Oncology), (клинические исследования проводились на мышах)



### Динамика выздоровления у больных гепатитом С

Метод – плацебо-контроль  
Группы – 39 носителей вируса гепатита (HCV),  
19 чел. – лечение «АНСС», 20 чел. – контрольная группа  
Дозировка – 6 грамм/день  
Период – 24 недели  
Измерение – HCV-RNA, уровень ALT  
Источник – Chutaputti, A., доклад на конференции ICNIM (Япония, 2010)



### Увеличение продолжительности жизни после операции

Метод – открытый, проспективная когорта  
Группы – 269 больных гепатоцеллюлярной карциномой (рак печени) после резекции, 113 человек получали «АНСС», 156 человек – контрольная группа  
Дозировка – 3 грамм/день  
Период – Февраль 1992 – Декабрь 2001  
Измерение – уровень выживших  
Источник – Kamiyama, Y. Научный журнал «Journal of Hepatology» (2002)

